

## أمينازين بودرة معدة للحقن

### التركيب الكيميائي :

كل عبوة سعة 20 مل تحتوي :

05.1 غ	ديمينازين أسيتيوريت
1.31 غ	فينازون

### الخصائص الدوائية :

ديمينازين أسيتيوريت مادة كيميائية تنتمي لمجموعة الدياميدين أروماتيك وهي قاتلة للتريبانوسوما والباييزيا

### الاستطباب :

يعطي أمينازين في الحالات التالية :

- الإصابة بالتريبانوسوما : كونجولنس - فيفاكس - بروسيبي
- الإصابة بالباييزيا : بايجيمينا - بوفيس - دايفيرجنز (عند الأبقار) - أوفيس - موتاسي (عند الأغنام) - أكواي - كابالاي (عند الخيول) - كانيس (عند الكلاب)

### طريقة الاستعمال :

يضاف لمحتويات الزجاجة 12.5 مل ماء مقطر معقم معد للحقن تكفي وزن 300 كغ حي (تعادل 3.5 مغ/كغ من وزن الجسم) وتكفي لستة رؤوس أغنام

- يجب أن يستعمل المحلول خلال 5 أيام إذا حفظ في درجة حرارة الغرفة 25 مئوية
- يجب أن يحفظ المحلول المحضر بعيداً عن الضوء

يعطى الأمينازين حقناً في عضلات الرقبة أو الفخذ وينصح بحقنه في مكانين مختلفين إذا كان حجم الحقنة أكثر من 10 مل

### الجرعات :

الجرعة العامة 3.5 مغ / كغ

### فترة السحب :

للحم : 28 يوماً الحليب : 3 أيام

### الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

### التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 20 مل