

## كلورامين بودرة ذوابة في الماء

### التركيب :

كل مغلف سعة 100 غ يحتوي :  
كلورنتراسايكلين هيدروكلورايد 20 غ  
الخصائص الدوائية :

ينتمي كلورنتراسايكلين إلى مجموعة التتراسايكلينات وهو موقف لنمو البكتيريا فعال ضد الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام (كاميبلوباكتري ، كلاميديا ، إيكولاي ، هايموفيلوس ، مايكوبلازما ، باستوريلا ، ريكتسيا ، سالمونيلا ، المكورات العنقودية ، المكورات السبحية )

إن تأثير كلورنتراسايكلين يعتمد على تثبيط تركيب بروتين الخلية الجرثومية .  
يطرح كلورنتراسايكلين بشكل أساسي عن طريق البول كما يطرح جزء منه عن طريق الصفراء ، ويطرح عند الحيوانات المنتجة للحليب عن طريق الحليب

### الاستطباب :

- العدوى المعدية المعوية والعدوى التنفسية الناتجة عن الأحياء الدقيقة الحساسة لكلورنتراسايكلين وذلك عند كل من الدواجن والأغنام والماعز والأبقار

### مضادات الاستطبابات :

- فرط الحساسية للتتراسايكلينات  
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

### الآثار الجانبية :

- قد يحدث رد فعل تحسسي  
- اصفرار الأسنان عند الحيوانات الصغيرة

### طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

### الجرعات :

الأبقار : 40 غ لكل حيوان لمدة 3-5 أيام  
الأغنام والماعز : 10 غ لكل حيوان لمدة 3 أيام  
الدواجن : 100-200 غ لكل لتر ماء لمدة 3-5 أيام

### فترة السحب :

المجترات : اللحم : 8 أيام الحليب : 3 أيام  
الدواجن : اللحم : 3 أيام البيض : 5 أيام

### الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

### التعبئة :

مغلف سعة 100 غ .