

## إنروجكت بلس محلول معد للحقن

### التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

إنروفلوكساسين 200 مغ

### الخصائص الدوائية :

ينتمي إنروفلوكساسين إلى مجموعة فلوروكوينولون وهو يعمل كمضاد للجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام ، كما أن له تأثيراً مضاداً للمايكوبلازما

### الاستطباب :

حالات العدوى المعدية المعوية والعدوى التنفسية كالباستوريلا والمايكوبلازما والعصيات القولونية والإيشريشيا كولاي والسالمونيلا

حالات العدوى الثانوية الناتجة عن العدوى الفيروسية كالمرض التنفسي المعقد عند الأبقار

### طريقة الاستعمال :

يعطى حقناً في العضل وتحت الجلد

### الجرعات :

الأبقار و الجمال و الخيول و الأغنام 1 مل / 40 كغ من وزن الجسم ولمدة 4 – 5 يوم متتالية .  
الكلاب 0.5 مل / 1 كغ من وزن الجسم ولمدة 4 – 5 يوم متتالية .

### فترة السحب :

اللحم : 14 يوماً الحليب : 7 أيام

### الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

### التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل