

## فلودوكس سائل معد للحقن

أسم المعمل الدوائي: الأمين لصناعة الأدوية البيطرية

أسم المستحضر الدوائي: فلودوكس

التركيب الكيميائي: كل 1 مل يحتوي على:

فلورفينيكول 100ملغ

دوكسيسيكليين هيكلات 100 ملغ

سواغات حتى 1 مل

**الخواص :**

**الفلورفينيكول**

يملك الفلورفينيكول أساساً فعلاً مثبطاً لتكاثر البكتيريا وذلك عن طريق ارتباطه بجزيء الرايبوسوم 50S وبالتالي منع إنتاج البروتين البكتيري.

ينتمي الدوكسيسيكليين إلى مجموعة التتراسكليين ويعمل على تثبيط الجراثيم ضد العديد من البكتيريا موجبة الجرام وسالبة الجرام ، مثل البورديتيلا ، والعطيفة ، والإشريكية القولونية ، والمستدمية ، والباستوريلا ، والسالمونيلا ، والمكورات العنقودية ، والمكورات العقدية. الدوكسيسيكليين فعال أيضاً ضد الكلاميديا والميكوبلازما والريكتسيا. يعتمد عمل الدوكسيسيكليين على تثبيط تخليق البروتين البكتيري. الدوكسيسيكليين له صلة كبيرة بالرنيتين ولذلك فهو مفيد بشكل خاص في علاج التهابات الجهاز التنفسي البكتيرية.

**الاستطبابات :**

لعلاج الأمراض المعدية التي تسببها البكتيريا: الالتهاب الرئوي ، والتهاب الأمعاء ، والتهابات المسالك البولية التناسلية ، والتهاب الضرع ، والتهاب الرحم ، وداء البستريات ، وداء السلمونيلا في الأبقار والأغنام والماعز والكلاب ، والقطط.

يوصف أيضاً لعلاج تعفن الظلف (التهاب أدمة القدم المعدي) في الأبقار أو التهاب ما بين الظلفين القيجي (التهاب ما بين الظلفين النخري) المصاحب لبكتيريا فيوزيباكتيريوم نيكروفورم وباكتيريويدس ميلانينوجينيكس.

**مضادات الاستطباب:**

لا تستخدم في حالات فرط الحساسية للمواد الفعالة .

لا يعطى عن طريق الوريد

**التأثيرات الجانبية:**

في المجترات ، قد يحدث انخفاض في استهلاك الغذاء وتلين عابر للبراز خلال فترة العلاج. تتعافى الحيوانات المعالجة بسرعة وبشكل كامل عند إنهاء العلاج. قد يؤدي إعطاء المنتج عن طريق الحقن العضلي وتحت الجلد إلى حدوث آفات التهابية في موقع الحقن تستمر لمدة 14 يوماً..

**التداخل الدوائي:**

لا ينبغي أن يعطى في وقت واحد مع مضادات الجراثيم ( البنسلين والسيفالوسبورين). يمكن للكاتيونات ثنائية التكافؤ أو ثلاثية التكافؤ ( Ca ، Al ، Fe ، Mg ) أن تخفف من تأثير التتراسكليينات .

**الاستعمال:** بالحقن العضلي العميق .

**الجرعات ومدة الاستخدام:**

كلاب و قطط: 1 مل لكل 8-10 كغ وزن حي

أغنام و ماعز و عجول : 1 مل لكل 15 كغ وزن مرة يوميا لمدة 3-5 أيام

أبقار: 1 مل لكل 15 كغ وزن مرة يوميا لمدة 3-5 أيام

أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

يجب عدم حقن أكثر من 10 مل في موقع واحد للأبقار و 6 مل للأغنام , حيث يمكن تقسيم الجرعة على مواقع حقن مختلفة.

فترة السحب: اللحم : 35 يوم. الحليب : 12 أيام

#### تنبيهات:

- احتمال حدوث تفاعل تحسسي وفي مثل هذه الحالة تعطى مضادات الهستامين فوراً و تتم المعالجة حسب الاعراض عند الضرورة

#### تحذيرات:

- يجب غسل الأيدي بعد استعمال العلاج
  - تجنب ملامسة العلاج للعيون و الفم والجلد
  - تجنب الأكل و الشرب و التدخين اثناء استعمال العلاج
  - تجنب تلويث البرك وقنوات ومصادر المياه
  - يجب التخلص من العبوات الفارغة بطريقة مأمونة وسليمة
- الحفظ:** يحفظ في مكان جاف و معتم بدرجة حرارة أقل من 30° م .
- التعبئة :** يعبأ المستحضر في عبوات زجاجية سعة 20-50-100 مل
- للاستخدام البيطري فقط**