

هيستامين حقن

التركيب: كل 1 مل تحوي على:

دايفنهايدرامين هيدروكلوريد
سواغ ك.ك.
25ملغم
1 مل

الاستطبابات :

دايفنهايدرامين مضاد فعال للهستامين كونه مستضدا لمستقبلات الهستامين هـ1 - مما يفسر آثاره المضادة لـ: إفراز الكولين - التقيؤ - السعال - بالإضافة إلى خصائصه المسكنة - يوصف في حالات الحساسية - فرط الحساسية التنفسية - الحكة - التهاب الجلد التحسسي - ويمكن استخدامه بفعالية أيضاً في التهاب الصفائح الحساسة عن الخيل والأبقار - دوار الحركة - التهاب الرحم - البيلة الأزوتية عند الخيل - وحالات سوء الهضم عند الخيل والأبقار والأغنام والماعز والكلاب والقطط.

مضادات الاستطباب: الحساسية تجاه المادة الفعالة, الحمل, النزف (فقدان الدم), الفشل القلبي والكبد.

التأثيرات الجانبية: يمكن تثبيط الجهاز العصبي المركزي (سبات إلى غيبوبة), وتأثيرات قلة إفراز الكولين (جفاف الفم, احتباس البول).

التأثير المسكن لمضادات الهستامين قد يتلاشى مع الوقت.
التأثير المسكن الهستامين قد يؤثر على أداء الكلاب العاملة.

التداخل الدوائي: لا يوجد ويجب عدم مزجه بمستحضرات أخرى بنفس المحقن.

الاستعمال: يعطى بالمحقن تحت الجلد أو بالمحقن العضلي أو الوريدي.

الجرعات ومدة الاستخدام:

أبقار وأغنام وخيول: 2-5 مل / 100 كغ من وزن الحيوان تستمر المعالجة لمدة 3 - 4 أيام.

الكلاب و القطط: 1 - 2 مل / 10 كغ وزن الحيوان تستمر المعالجة لمدة 3 - 4 أيام.

فترة السحب: الحليب والحم: 5 أيام

التحذيرات الأخرى: لا يستخدم عند الحيوانات الحوامل.

لا يستخدم المستحضر في حالات احتباس البول, الماء الزرقاء في العين, تضخم الغدة الدرقية.

لا يعطى في حالات التحسس الزائدة لمستحضرات دايفنهايدرامين والمضادات الهستامينية

الأخرى.

لا يجب استعماله إلا حقناً.

فرط الجرعة قد يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي المركزي (استثارة نوبات) أو تثبيط (سبات

إلى غيبوبة), وتأثيرات قلة إفراز الكولين, تثبيط تنفسي, موت

الحفظ: يحفظ في مكان بارد وجاف ومظلم وبدرجة حرارة لا تزيد عن 30 م.

التعبئة: يعبأ المستحضر في عبوات زجاجية سعة 20-50-100 مل

للاستخدام البيطري فقط