

لينكومين بودرة نوابة في الماء

التركيب :

كل عبوة بلاستيكية سعة 100 غ تحتوي :
سبيكتينومايسين سلفات 44.5 غ
لينكوماميسين هيدروكلورايد 22.2 غ

الخصائص الدوائية :

إن الجمع بين لينكوماميسين وسبيكتينومايسين يعطي تأثيراً تراكمياً وأحياناً تآزرياً .
سبيكتينومايسين هو موقف لنمو الجراثيم أو قاتل لها وذلك حسب تركيز الجرعة
ويكون تأثيره بشكل أساسي ضد الجراثيم سلبية الغرام مثل كامبيلوباكتريز - إيكولاي
- المايكوبلازما والسالمونيلا
لينكوماميسين هو موقف لنمو الجراثيم ويؤثر بشكل أساسي ضد الجراثيم إيجابية
الغرام كالمكورات العنقودية والمكورات السبحية

الاستطباب :

يستعمل عند الدواجن في العلاج والوقاية من المرض التنفسي المزمن CRD كما
يستعمل لزيادة معدل التحويل .

مضادات الاستطبابات :

- الحساسية المفرطة للسبيكتينومايسين و/أو اللينكوماميسين
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي
- لا يعطى للدجاج الذي يستخدم إنتاجه من البيض للاستهلاك البشري

الآثار الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

التداخل الدوائي:

لا يعطى مع البنسيلينات - السيفالوسبورينات - الكينولونات .

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

الجرعات :

100 غ لكل 125 لتر ماء ويعطى بعد حله في الماء كمصدر وحيد للشرب خلال
الأيام 5 - 7 من عمر الطير

فترة السحب :

اللحم : 7 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

علبة بلاستيكية سعة 100 غ