

مونوزول بودرة ذوابة في الماء

التركيب :

كل عبة سعة 500 غ :

نيكلوزاميد 375 غ

الخصائص الدوائية :

يؤثر النيكلوزاميد على جدار الخلية في الطفيلي وذلك بإقفال حلقة كريب في الديدان الشريطية ، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم حمض اللبن وبالتالي موت الطفيلي .

الاستطبابات :

الديدان الخيطية المعدية المعوية : الأطوار اليرقية والبالغة من : هايمونكوس –

أوسترتاجيا – ترايكوسترونجيلوس – نيماتوديروس – كوبريا بونوستوموم –

الأطوار البالغة : من أيسوفوجوستوموم – شابرتيا – سترونجيلويدس

الديدان الشريطية : مونيزيا

الديدان الكبدية : الأطوار البالغة (فاشيولا)

مضادات الاستطباب :

لا يستعمل في الأشهر الأولى من الحمل

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

الجرعات :

الأبقار : 50 مغ لكل كغ من وزن الحيوان

الأغنام والماعز: 75 مغ لكل كغ من وزن الحيوان

فترة السحب :

اللحم 14 يوم الحليب 5 يوم

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبدة بلاستيكية سعة 500 غ