

أوكسامين بودرة ذوابة في الماء

التركيب :

كل مغلف سعة 100 غ يحتوي :
أوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد 20 غ

الخصائص الدوائية :

أوكسي تتراسايكلين مضاد حيوي واسع الطيف وهو موقف لنمو البكتيريا فعال ضد الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام (كامبيلوباكتر ، كلاميديا ، إيكولاي ، هايروفيلوس ، مايكوبلازما ، باستوريلا ، ريكتيسيا ، سالمونيلا ، المكورات العنقودية ، المكورات السبحية)

إن تأثير أوكسي تتراسايكلين يعتمد على تثبيط تركيب بروتين الخلية الجرثومية .
ي طرح تتراسايكلين بشكل أساسي عن طريق البول كما يطرح جزء منه عن طريق الصفراء ، ويطرح عند الحيوانات المنتجة للحليب عن طريق الحليب

الاستطباب :

- العدوى المعدية المعوية والعدوى التنفسية الناتجة عن الأحياء الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسايكلين (كوراينباكتيريوم ، كامبيلوباكتر ، كلاميديا ، إيكولاي ، هايروفيلوس ، مايكوبلازما ، باستوريلا ، ريكتيسيا ، سالمونيلا ، المكورات العنقودية ، المكورات السبحية)

وذلك عند كل من الدواجن والأغنام والماعز والأبقار والجمال

مضادات الاستطبابات :

- فرط الحساسية للتتراسايكلينات
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

الآثار الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

التداخل الدوائي:

لا يعطى مع البنسيلينات أو السيفالوسبورينات

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

الجرعات :

الأبقار والجمال : 15 غ لكل 100 كغ من وزن الحيوان لمدة 3 أيام

الأغنام والماعز : 2 غ لكل 10 كغ من وزن الحيوان لمدة 3 أيام

الدواجن : 100-200 غ لكل 200 لتر ماء لمدة 5 أيام

فترة السحب :

المجترات : اللحم : 8 أيام الحليب : 12 ساعة

الدواجن : اللحم : 6 أيام البيض : 5 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

مغلف سعة 100 غ .