

أموجكت

معلق معد للحقن

للاستعمال البيطري فقط

التركيب الكيميائي :

كل 1 مل يحتوي

أموكسي سللين

جنتاميسين سلفات

150 مغ

40 مغ

الخواص الدوائية :

الأموكسيسيللين مضاد حيوي واسع الطيف وتأثيره مشابه لتأثير الأمبيسللين وآلية تأثيره تكون على جدار الخلية الجرثومية وهو يؤدي عند تركيز معين إلى انحلال جدار الخلية بدون رجوعها إلى حالتها الطبيعية

أما الجنتاميسين فهو مضاد حيوي واسع الطيف أيضاً يؤثر على الجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام والإيشريشيا كولي والكليبيسيلا والمكورات والعنقودية والسبحية وخاصة في الالتهابات التنفسية والبولية والتناسلية وفي حالات التسمم الدموي الجرثومي

إن المشاركة بين الأموكسيسيللين والجنتاميسين تؤدي إلى زيادة التركيز العلاجي للدواء وتجعله طويل الأمد

الاستطباب :

عند الأبقار والأغنام والماعز : ذات الجنب – الإسهال – التهاب الأمعاء – عدوى الباستوريلا والعصيات القولونية - التهاب الضرع – التهاب الرحم – الخراجات الجلدية

عند الخيول : ذات الجنب – الإسهال – التهاب الأمعاء – عدوى الجهاز البولي التناسلي – الخراجات الجلدية - التهاب الحافر

مضادات الاستطباب :

فرط الحساسية للبنسلينات و/أو الأمينوغليكوسيدات لا يعطى للحيوانات التي تعاني من الفشل الكلوي

طريقة الاستعمال :

يعطى بالحقن العضلي

في حال كون الجرعة عالية (كما هو الحال عند الأبقار والخيول) ينصح بتوزيع الجرعة على أكثر من مكان لمزيد من الامتصاص رج العبوة جيداً قبل الاستعمال

الجرعات :

للأبقار : 30 – 40 مل لكل حيوان
للخيول : 30 – 50 مل لكل حيوان
للعجول : 10 – 15 مل لكل حيوان
للمهور 5 – 15 مل لكل حيوان
للأغنام والماعز : 5 – 10 مل لكل حيوان
للحملان : 1 – 5 مل لكل حيوان

فترة السحب :

للحم : 30 يوماً للحليب : يومان

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 50 و 100 مل .