

أموكسيمين معلق معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

أموكسي سيللين تراهيدرات 150 مغ

الخصائص الدوائية :

أموكسي سيللين مضاد حيوي نصف تركيبى ينتمي لعائلة البنسلينات وهو قاتل للبكتيريا واسع الطيف ضد عدد كبير من الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام .

تتمثل آلية التأثير للأموكسي سيللين بمنع تركيب الجدار الخلوي للبكتيريا .
ي طرح أموكسي سيللين بشكل أساسي عن طريق البول كما يطرح جزء منه عن طريق الصفراء .

الاستطباب :

- العدوى التنفسية والعدوى المعدية المعوية والعدوى البولية التناسلية التي تسببها الأحياء الدقيقة الحساسة للأموكسي سيللين .
 - العدوى البكتيرية الثانوية خلال سير الأمراض الفيروسية .
- في كل من الأبقار والأغنام والماعز .

مضادات الاستطبابات :

- الحساسية المفرطة للأموكسي سيللين .
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

الآثار الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

التداخل الدوائي:

لا يعطى مع النترات سايكلينات - كلورامفينيكول - الماكروليدات - اللينكوساميدات

طريقة الاستعمال :

يعطى بالحقن العضلي

رج العبوة جيداً قبل الاستخدام

الجرعات :

الجرعة العامة لجميع الحيوانات 1 مل لكل 15 كغ من وزن الحيوان مرة واحدة يومياً لمدة 3 أيام

يمكن مضاعفة الجرعة في الإصابات الشديدة حيث لا يوجد خوف من التسمم

فترة السحب :

اللحم : 14 يوماً الحليب : 3 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل .