

أموكلاف فورت معلق معد للحقن

أسم المعمل الدوائي: الأمين لصناعة الأدوية البيطرية

أسم المستحضر الدوائي: أموكلاف فورت

التركيب الكيميائي: كل 1 مل يحتوي على:

كلافونيك أسيد (بوتاسيوم كلافونات) 35 ملغ

أموكسيسيلين (تريهيدرات) 140 ملغ

سواغات حتى 1 مل

الاستطباب: يوصى باستخدام أموكلاف فورت في الحالات التالية:

يستخدم في الأبقار والكلاب والقطط لعلاج الالتهابات الجهازية التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأموكسيسيلين وحمض الكلافونيك.

الأبقار : في علاج التهابات الجهاز التنفسي (الالتهاب الرئوي ، الالتهاب الرئوي القصي ، الالتهاب الرئوي الجنبى) ، التهابات الجهاز الهضمي ، التهابات الجهاز البولي التناسلي (التهاب الكلية ، التهاب الحويضة والكلية ، التهاب المثانة) ، التهابات الجلد والأنسجة الرخوة (الخراجات ، التهابات المفاصل والسرة) ، التهابات الجروح والقدم ، والتهابات ما بعد الجراحة وأيضاً كدعم بالحقن في العلاج الموضعي لالتهاب الضرع والتهاب الرحم.

القطط والكلاب: في علاج التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجهاز الهضمي والتهابات الجلد والأنسجة الرخوة مثل الخراجات والتهاب اللثة والتهاب الحويصلات الشرجية وتقريح الجلد والتهابات الجهاز البولي التناسلي مثل التهاب الكلية والتهاب المثانة والتهاب الإحليل والتهابات ما بعد الجراحة.

مضادات الاستطباب:

لا تستخدم في الحيوانات التي لديها حساسية معروفة للبنسلين أو أي مواد أخرى من مجموعة بيتا لاكتام.

لا تستخدم في الحيوانات التي تعاني من خلل خطير في الكلى مصحوباً بانقطاع البول أو قلة البول.

لا تستخدمه في الأرانب أو خنازير غينيا أو الهامستر

التأثيرات الجانبية:

نادراً ما يحدث الإسهال والقيء والتعرق بعد اعطاء المستحضر. قد يؤدي استخدام المنتج أحياناً إلى الشعور بألم أو حكة عند الحقن و / أو تفاعل الأنسجة المحلي.

التداخل الدوائي:

لا يعطى بالمشاركة مع التتراسيكلينات و الماكروليدات و السلفاميدات .

الاستعمال: يعطى بالحقن العضلي العميق .

الجرعات ومدة الاستخدام:

الأبقار: 1 مل لكل 20 كغ وزن حي يوميا لمدة 3-5 أيام

الكلاب والقطط : 0.1 مل لكل 2 كغ وزن حي يوميا لمدة 3-5 أيام (تحت الجلد)

لا يعطى للأبقار أكثر من 10 مل في المكان الواحد .

ملاحظة: رج العبوة جيدا قبل الاستعمال.

فترة السحب: اللحم : 42 يوم الحليب : 80 ساعة (3.5 يوم)

التحذيرات الأخرى: لا يعطى للحيوانات التي تعاني حساسية للبنسلينات

الحفظ: يحفظ في مكان بارد وجاف ومظلم وبدرجة حرارة لا تزيد عن 15 م°.

التعبئة: يعبأ المستحضر في عبوات زجاجية سعة 20-50-100 مل

للاستخدام البيطري فقط