

أمينوسيللين معلق معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل تحتوي :

أمبيسيللين ترايهايدرات 200 مغ

الخصائص الدوائية :

أمبيسيللين مضاد حيوي نصف تركيبى ينتمي لعائلة البنسلينات وهو قاتل للبكتيريا واسع الطيف ضد عدد كبير من الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام (المكورات العنقودية والمكورات السبحية ، كامبيلو باكتر ، كلوستريديوم ، إيكولاي ، سالمونيلا ، باستوريلا ، هايموفيلوس) .

تتمثل آلية التأثير للأمينوسيللين بمنع تركيب الجدار الخلوي للبكتيريا .
يطرح أمبيسيللين بشكل أساسي عن طريق البول كما يطرح جزء منه عن طريق الصفراء .

الاستطباب :

يوصف أمينوسيللين لعلاج التهاب الضرع ، التهاب الرحم ، العدوى المعدية المعوية والعدوى التنفسية والعدوى البولية التي تسببها الأحياء الدقيقة الحساسة للأمينوسيللين . وذلك عند الخيول والجمال والأبقار والأغنام والماعز .

مضادات الاستطباب :

- فرط الحساسية للبنسيلينات

- لا يعطى للحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

التأثيرات الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

التداخل الدوائي :

لا يعطى مع النتراسايكلينات - كلورامفينيكول - ماکروليدات - لينكوساميدات .

طريقة الاستعمال :

يعطى بالحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد

رج العبوة جيداً قبل الاستخدام

الجرعات :

الجرعة العامة : 1 مل لكل 20 كغ من وزن الجسم لمدة 3-5 أيام

يمكن زيادة الجرعة في العدوى الشديدة دون الخوف من حدوث تسمم .

فترة السحب :

للحم : 8 أيام الحليب : 3 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل .