

أوكسي جكت 20% مديد محلول معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

أوكسي تتراسايكلين دايهايدرات 200 مغ

الخصائص الدوائية :

أوكسي تتراسايكلين مضاد حيوي واسع الطيف وهو موقف لنمو البكتيريا فعال ضد الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام (كامبيلوباكتر ، كلاميديا ، إيكولاي ، هايروفيلوس ، مايكوبلازما ، باستوريلا ، ريكييتسيا ، سالمونيلا ، المكورات العنقودية ، المكورات السببية)

إن تأثير أوكسي تتراسايكلين يعتمد على تثبيط تركيب بروتين الخلية الجرثومية .
يطرح تتراسايكلين بشكل أساسي عن طريق البول كما يطرح جزء منه عن طريق الصفراء ، ويطرح عند الحيوانات المنتجة للحليب عن طريق الحليب

الاستطباب :

العدوى التي تسببها الأحياء الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسايكلين :
العدوى التنفسية - العدوى المعدية المعوية - التهاب الرحم - التهاب الضرع - السالمونيلا -
الديسنتريا - عفن الظلف - التهاب الجيوب - عدوى الجهاز البولي - المايكوبلازما -
المرض التنفسي المزمن - حمى الشحن - خراجات الكبد .
عند الجمال والأبقار والأغنام والماعز .

مضادات الاستطبابات :

- فرط الحساسية للأوكسي تتراسايكلين
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي
- لا يعطى للخيل

الآثار الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

التداخل الدوائي:

لا يعطى مع البنسيلينات أو السيفالوسبورينات

طريقة الاستعمال :

عن طريق الحقن العضلي

الجرعات :

الجرعة العامة : 1 مل لكل 10 كغ من وزن الحيوان

تعاد الجرعة في الحالات الشديدة بعد استشارة الطبيب البيطري المعالج .

فترة السحب :

اللحم : 21 يوماً الحليب : 7 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل .