

إنروجكت 10% محلول معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

إنروفلوكساسين 100 مغ

الخصائص الدوائية :

ينتمي إنروفلوكساسين إلى مجموعة فلوروكوينولون وهو يعمل كمضاد للجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام ، كما أن له تأثيراً مضاداً للمايكوبلازما

الاستطباب :

العدوى المعدية المعوية والتنفسية والبولية المتسببة بالبكتيريا الحساسة للإنروفلوكساسين (كامبيلوباكتري - الايشريشيا كولي - هايموفيلوس - مايكوبلازما - باستوريلا - سالمونيلا) في الجمال والأبقار والأغنام والماعز

مضادات الاستطباب :

- الحساسية المفرطة للإنروفلوكساسين
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

التأثيرات الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

التداخل الدوائي :

- لا يعطى مع التتراسايكلينات - كلورامفينيكول - ماكروليدات - لينكوساميدات

طريقة الاستعمال :

عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد .

الجرعات :

الجرعة العامة: 1 مل لكل 40 كغ من وزن الجسم لمدة 4-5 أيام

فترة السحب :

اللحم : 21 يوماً الحليب : 4 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل .