

إنرومين 10% سائل معد للشرب

التركيب : كل 1 مل يحتوي :

إنروفلوكساسين 100 مغ

الخصائص الدوائية :

ينتمي إنروفلوكساسين إلى مجموعة فلوروكوينولون وهو يعمل كمضاد للجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام ، كما أن له تأثيراً مضاداً للمايكوبلازما

الاستطباب :

العدوى المعدية المعوية والتنفسية والبولية المتسببة بالبكتيريا الحساسة للإنروفلوكساسين (كاميلوباكتر - الايشريشيا كولي - هايموفيلوس - مايكوبلازما - باستوريل - سالمونيلا) في كل من المجترات والدواجن .

مضادات الاستطباب :

- الحساسية المفرطة للإنروفلوكساسين

- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

التأثيرات الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

التداخل الدوائي :

- لا يعطى مع التتراسايكلينات - كلورامفينيكول - مكاروليدات - لينكوساميدات

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

الجرعات :

الدواجن : 100 مل لكل 200 لتر ماء شرب لمدة 3-4 أيام

المجترات : 1 مل لكل 20 كغ من وزن الحيوان لمدة 3 - 4 أيام

فترة السحب :

المجترات : اللحم : 7 أيام الحليب : 3 أيام

الدواجن : اللحم : 4 أيام البيض : 3 أيام

الحفظ : يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة : عبوة بلاستيكية سعة 1 ليتر و100 مل