

أفرمين سوبر 2% حقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي على :

ايفرمكتين 20 ملغ

الخواص:

الايفرمكتين (مشتقات الافرمكتين) مأمون الاستعمال وواسع الفعالية ضد الطفيليات الداخلية و الخارجية التي تهاجم الثروة الحيوانية.

تعمل مادة الايفرمكتين على اثارة الجهاز العصبي للطفيليات لتفرز مادة (جاما أمينوبيوتريلك) والتي تعمل بدورها كناقل عصبي كيميائي للإشارات بين الخلايا العصبية نفسها أو بين الخلايا العصبية و العضلية حيث تنقطع تلك الاشارات مما يؤدي إلى شلل الطفيليات وموتها. يتميز بسرعة انتشاره في الدورة الدموية وبطول فترة إطراحه من الجسم مما يؤدي إلى تأثير دائم في مكافحة الطفيليات.

الاستطباب:

يستخدم للعلاج والوقاية من الديدان الأسطوانية المعدية والمعوية والديدان الرئوية وديدان العين والقمل والجرب وذباب النخف في الأبقار والأغنام والماعز والجمال. الديدان الأسطوانية المعدية المعوية: (البالغة ويرقات الطور الرابع) بونوستوموم – تشابريا – كوبريا – هيمونكس- نيמתادورس- أوزوفاغوستوموم – سترونجيلوس- تريشوسترنجيلوس- أوسترتاغيا - تريشوريس.

الديدان الرئوية: (البالغة ويرقات الطور الرابع) ديكتيوكاولس – بروسترونجلوس عند الأغنام

ديدان العين : (الأطوار البالغة) ثيلازيا عند الأبقار

نخف الأنف عند الأغنام والجلد عند الأبقار

القمل والجرب والقراد

الجرعات ومدة الاستخدام:

الأبقار والجمال : 1 مل لكل 25 كغ وزن حي جرعة واحدة

الأغنام والماعز : 0,5 مل لكل 12.5 كغ وزن حي جرعة واحدة

فترة السحب: اللحم : الأبقار والجمال: 35 يوم والأغنام والماعز : 42 يوم

ملاحظات: يجب عدم حقن أكثر من 10 مل في موقع واحد , حيث يمكن تقسيم الجرعة على مواقع حقن مختلفة.

في حالة الإصابة الشديدة, تكرر الجرعة بعد اسبوع من الجرعة الأولى

لمعالجة الجرب في الأغنام و الماعز و الجمال : تعطى جرعة ثانية بعد اسبوع (للأغنام) وبعد

15 يوم للجمال

تنبيهات:

لا يعطى للحيوانات الحلابة أو خلال 28 يوم قبل الولادة

احتمال حدوث تهيج تفاعلي موضعي عابر في موقع الحقن

يجب معالجة نخف الجلد في الأبقار بعد انتهاء موسم الذباب المسببة للإصابة

ينصح بإعطاء لقاح كوستريديا للأغنام قبل مكافحة الديدان

تحذيرات:

يجب غسل الأيدي بعد استعمال العلاج

تجنب ملامسة العلاج للعيون و الفم والجلد

تجنب الأكل و الشرب و التدخين اثناء استعمال العلاج

تجنب عدم تلويث البرك وقنوات و مصادر المياه

يجب التخلص من العبوات الفارغة بطريقة مأمونة وسليمة

التخزين:

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال الأطفلة الأطفمة والشراب
يُحفظ في مكان بارد وجاف ومظلم وبدرجة حرارة لا تزيد عن 30 م.
العبوات : عبوة زجاجية سعة 20-50-100 مل