

بوتاجكت محلول معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

بوبرافاكون 50 ملغ

الخصائص الدوائية :

إن دراسة تأثير البوبرافاكون على الطور البالغ من الثايليريا بارفا المستتبتة على مزارع من الخلايا اللمفية أثبتت حدوث فجوات في هيولى خلية الثايليريا كأفة أولية بينما لا يتأثر الغشاء الخارجي للخلية وغشاء النواة حتى يصل الفساد إلى درجة متقدمة لا يوجد تأثير معاكس واضح لتركيب الخلايا اللمفاوية المضيفة بما فيها المتقدرات الأمر الذي يؤكد تخصص طريقة تأثير البوبرافاكون بالنسبة للطفيلي وهذا ما يفسر أيضاً الطيف الضيق لتأثير هذا المركب والذي يقتصر على أنواع محددة من الطفيليات أحادية الخلية

الاستطابات :

يوصف لعلاج حالات الإصابة بطفيلي الثايليريا (حمى الساحل الشرقي, داء الثايليريا المداري.....) عند الأبقار والذي تسببه الثايليريا أنيولاتا والثايليريا أورينتاليس(سيرجنتي) والثايليريا بارفا (بارفا) والثايليريا بارفا(بوفيس) والثايليريا بارفا(لورينسي) والثايليريا ميوتانس، وهو فعال ضد كل من الطور اليرقي والبالغ ويمكن أن يستخدم في مرحلة الحضانة أو عند وضوح الأعراض السريرية للمرض

طريقة الاستعمال :

يعطى عن طريق الحقن العميق في العضل

الجرعات :

1مل لكل 20 كغ من وزن الجسم

في الحالات الشديدة يمكن إعطاؤه جرعة أخرى بعد 48 – 72 ساعة من الجرعة الأولى ينصح بإعطائه في منطقة الرقبة وفي حال إعادة الجرعة يتم الحقن على الجهة الأخرى من الرقبة

يجب الانتباه إلى عدم الحقن ضمن مناطق رطبة أو ملوثة من الجلد

لا يحقن أكثر من 10 مل في جهة واحدة

التحذيرات :

لا يعطى حقناً بالوريد أو تحت الجلد

التأثيرات الجانبية :

قد يحدث تضخم موضعي غير مؤلم في منطقة الحقن

معلومات إضافية :

في الحالات الشديدة قد يحصل انحطاط عام في الجسم الأمر الذي يتطلب معالجة إضافية من الدواء

الحيوانات الشافية تكتسب مناعة ضد السلالة التي أصيبت بها ولكن يمكن أن تصاب بسلالة أخرى مما يتطلب معالجة إضافية لداء الثايليريا

تأثير الطفيل شديد على الجهاز المناعي لذا ينصح بتأجيل إعطاء اللقاحات حتى يتم الشفاء من هذا المرض

فترة السحب :

اللحم : 42 يوماً الحليب : 48 ساعة

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 20 مل