

تايموجكت محلول معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

تايلوزين تارتارات 200 مغ

الخصائص الدوائية :

تايلوزين هو مضاد حيوي ماكروليدي يؤثر بشكل أساسي في الجراثيم إيجابية الغرام ، بعض الجراثيم الملتوية (بما فيها اللولبيات) ، العصيات الشعاعية ، المايكوبلازما ، هايموفيلوس بيرتوسيس ، وبعض المكورات سلبية الغرام .
يصل تركيز الجرعة العلاجية إلى الدم بعد ساعتين من الحقن .

الاستطباب :

العدوى التي تسببها الأحياء الدقيقة الحساسة للتايلوزين : (عند الأبقار والعجول والأغنام والماعز)

- عدوى الجهاز التنفسي
- التهاب القصبات
- التهاب الرئة
- حمى الشحن
- الديسنتريا
- التهاب المفاصل
- التهاب الضرع
- التهاب بطانة الرحم
- عفن الظلف

- عدوى ما بعد العمليات الجراحية

مضادات الاستطبابات :

- فرط الحساسية للتايلوزين

التداخل الدوائي:

لا يعطى مع البنسيلينات أو السيفالوسبورينات أو الكوينولونات

طريقة الاستعمال :

عن طريق الحقن العضلي

الجرعات :

الجرعة العامة 1 مل لكل 20 مل من وزن الجسم يومياً ولمدة 3-5 أيام .

فترة السحب :

اللحم : 10 يوماً الحليب : 4 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل .

