

ترايموجكت محلول معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

سلفاديازين صوديوم 200 مغ

تراي ميثوبريم 40 غ

الخصائص الدوائية :

إن الجمع بين سلفاديازين وتراي ميثوبريم ينتج عنه عمل تآزري ضد عدد كبير من الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام

الاستطباب :

العدوى المعدية المعوية والتنفسية والبولية التناسلية وحالات التسمم الدموي الناتجة عن الأحياء الدقيقة الحساسة لتراي ميثوبريم وسلفاديازين (إيكولاي ، هايموفيلوس ، باستوريلا ، سالمونيلا ، المكورات العنقودية ، المكورات السبحية) عند الخيول والأبقار والأغنام والكلاب والقطط.

مضادات الاستطباب :

- فرط الحساسية تجاه ترايموثيريم و/أو سلفاديازين

- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

الآثار الجانبية :

- رد فعل تحسسي

- بعد المعالجة الطويلة والجرعات العالية قد يحدث بيلة بللورية

طريقة الاستعمال :

يعطى بالحقن العضلي والحقن الوريدي البطيء والحقن تحت الجلد

الجرعات :

الخيول والأبقار والأغنام : 1 مل لكل 16 كغ من وزن الجسم

القطط والكلاب : 1 مل لكل 8 كغ من وزن الجسم

فترة السحب :

اللحم : 5 أيام الحليب : 3 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

علبة زجاجية سعة 100 مل