

زامين معلق معد للشرب

التركيب : كل 1 مل يحتوي :

أوكسي كلوزانيد 60 مغ

ليفاميزول هيدروكلورايد 30 مغ

الخصائص الدوائية :

يعمل أوكسي كلوزانيد مع ليفاميزول ضد طيف واسع من الديدان المعدية المعوية والديدان الرئوية

ليفاميزول هو مضاد ديدان واسع الطيف يؤثر على الأطوار البالغة ومعظم الأطوار اليرقية في الديدان الخيطية المعوية والديدان الرئوية عند المجترات

أوكسي كلوزانيد هو ساليسيلانيليد يعمل ضد الديدان المسطحة المثقوبة والديدان الخيطية الماصة للدم .

الاستطباب :

للوقاية والعلاج من :

الديدان الخيطية المعدية المعوية : هايمونكوس – أوسترتاجيا – ترايكوسترونجيلوس –

نيماتوديروس – كوبيريا- شابرثيا - بونوستوموم

الديدان الرئوية : ديكتيوكاولوس

الديدان الكبدية : (فاشيولا هيباتيكا)

مضادات الاستطباب :

- لا يعطى في المراحل المبكرة من الحمل

- لا يعطى للحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

- فرط الحساسية للأوكسي كلوزانيد و / أو ليفاميزول

التأثيرات الجانبية :

الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى إثارة ، إفراز دمعي ، تعرق ، سيلان لعابي غزير ، فرط عمق تنفس ، تقيؤ ، مغص وتشنج .

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

ترج العبوة جيداً قبل الاستعمال

الجرعات :

الأبقار والعجول: 2.5 مل لكل 10 كغ وزن حي

للأغنام و الماعز: 1 مل لكل 4 كغ وزن حي

فترة السحب :

اللحم : 28 يوماً الحليب : 4 أيام

الحفظ : يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة : عبوة بلاستيكية سعة 1 لتر – 500 مل و 100 مل .