

ستربتومين معلق معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

200000 وحدة دولية

بروكائين بنسيلين جي

200 مغ

ديهايدروستربتومايسين سلفات

الخصائص الدوائية :

إن الجمع بين بنسيلين جي وديهايدروستربتومايسين يعطي تأثيراً تراكمياً وأحياناً تآزرياً .

بوكائين بنسيلين جي هو مضاد حيوي قاتل للجراثيم ويكون تأثيره بشكل أساسي ضد الجراثيم إيجابية الغرام .

أما ديهيدروستربتومايسين فهو ينتمي إلى مجموعة أمينوجليكوسيدات وهو يملك تأثيراً قاتلاً للبكتيريا ويؤثر بشكل أساسي على الجراثيم سلبية الغرام .

الاستطباب :

يوصف لعلاج حالات التهاب المفاصل ، التهاب الضرع ، العدوى التنفسية والعدوى المعدية المعوية والعدوى البولية التي تسببها الأحياء الدقيقة الحساسة للبنسلين جي وديهايدروستربتومايسين في كل من الأبقار والأغنام والمازر .

مضادات الاستطبابات :

- الحساسية المفرطة للبنسيلين ، البروكائين ، الأمينوجليكوسيدات .
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

الآثار الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

التداخل الدوائي:

لا يعطى مع النتراتاسايكلينات - كلورامفينيكول - الماكروليدات - اللينكوساميدات

طريقة الاستعمال :

يعطى بالحقن العضلي

رج العبوة جيداً قبل الاستخدام

الجرعات :

الأبقار : 1 مل لكل 20 كغ من وزن الحيوان لمدة 3 أيام

الأغنام والمازر : 1 مل لكل 10 كغ من وزن الحيوان لمدة 3 أيام

فترة السحب :

اللحم : 21 يوماً الحليب : 3 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل .