

سلفابريم بودرة نوابة في الماء

التركيب :

كل مغلف سعة 100 غ يحتوي :
سلفاديازين صوديوم 20 غ
تراي ميثوبريم 5 غ

الخصائص الدوائية :

إن الجمع بين سلفاديازين وتراي ميثوبريم ينتج عنه عمل تآزري ضد عدد كبير من الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام ويكون الامتصاص من القناة الهضمية للمادتين سريعاً

الاستطباب :

العدوى المعدية المعوية والتنفسية الناتجة عن الأحياء الدقيقة الحساسة لتراي ميثوبريم وسلفاديازين (إيكولاي ، هايموفيلوس ، باستوريلا ، سالمونيلا ، المكورات العنقودية ، المكورات السبحية) عند الجمال والأبقار والأغنام والدواجن.

مضادات الاستطباب :

- فرط الحساسية تجاه تراي ميثوبريم و/أو سلفاديازين
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

الآثار الجانبية :

- رد فعل تحسسي
- بعد المعالجة الطويلة والجرعات العالية قد يحدث بيلة بللورية

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب

الجرعات :

الجمال والأبقار : 15 غ لكل 100 كغ من وزن الجسم لمدة 3-5 أيام
الأغنام والماعز : 5 غ لكل حيوان لمدة 3-5 أيام
الدواجن : 100 غ لكل 200 ليتر لمدة 3-5 أيام

فترة السحب :

الدواجن : اللحم : 3 أيام البيض : 3 أيام
المجترات : اللحم : 8 أيام الحليب : 3 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .
التعبئة :

مغلف سعة 100 غ .