

سلفامين 10%  
معلق معد للشرب

**التركيب:** كل مل يحتوي :

سلفاديازين صوديوم 100 مغ  
تراي ميثوبريم 20 غ

**الخصائص الدوائية:**

إن الجمع بين سلفاديازين وتراي ميثوبريم ينتج عنه عمل تآزري ضد عدد كبير من الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام ويكون الامتصاص من القناة الهضمية للمادتين سريعاً **الاستطباب:**

العدوى المعدية المعوية والتنفسية الناتجة عن الأحياء الدقيقة الحساسة لتراي ميثوبريم وسلفاديازين (إيكولاي ، هايموفيلوس ، باستوريلا ، سالمونيلا ، المكورات العنقودية ، المكورات السبحية) عند الجمال والأبقار والأغنام والدواجن.

**مضادات الاستطباب:**

- فرط الحساسية تجاه ترايموثوبريم و/أو سلفاديازين  
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

**الآثار الجانبية :**

- رد فعل تحسسي  
- بعد المعالجة الطويلة والجرعات العالية قد يحدث بيلة باللورية

**طريقة الاستعمال:**

عن طريق الفم مع ماء الشرب  
رج العبوة جيداً قبل الاستعمال

**الجرعات:**

المجترات: 2 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم لمدة 4-5 أيام  
الدواجن: 200 مل لكل 100 لتر ماء الشرب لمدة 4-5 أيام

**فترة السحب:**

الدواجن: اللحم: 3 أيام البيض: 3 أيام

المجترات: اللحم: 8 أيام الحليب: 3 أيام

**الحفظ :** يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

**التعبئة:** علبه بلاستيكية سعة 1 لتر – 500 مل – 200 مل و100 مل .