

كلوموجكت بودرة معدة للحقن

التركيب :

كل عبوة سعة 50 مل تحتوي :
أموكسي سيلين تراهيدرات 6 غ
كلوكساسيلين صوديوم 4 غ

الخصائص الدوائية :

إن الكلوكساسيلين يعتبر علاجاً نوعياً للمكورات العنقودية والمقاومة للبنسلين جي والتي تسبب معظم حالات التهاب الضرع

أموكسي سيلين مضاد حيوي نصف تركيبى ينتمي لعائلة البنسلينات وهو قاتل للبكتيريا واسع الطيف ضد عدد كبير من الجراثيم إيجابية الغرام والجراثيم سلبية الغرام .
تتمثل آلية التأثير للأموكسي سيلين بمنع تركيب الجدار الخلوي للبكتيريا .
يطرح أموكسي سيلين بشكل أساسي عن طريق البول كما يطرح جزء منه عن طريق الصفراء .

الاستطباب :

التهاب الضرع ، التهاب الرحم ، العدوى المعدية المعوية والعدوى البولية التناسلية التي تسببها الأحياء الدقيقة الحساسة للأموكسي سيلين والكلوكساسيلين .
في كل من الجمال والخيول الأبقار والأغنام والماعز .

مضادات الاستطبابات :

- الحساسية المفرطة للأموكسي سيلين و/ أو الكلوكساسيلين .
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي

الآثار الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

طريقة الاستعمال :

يعطى بالحقن العضلي والحقن داخل الضرع

- مدد المحتوى بماء معقم حتى 50 مل

- في حالة الحقن داخل الضرع : أفرغ محتويات الضرع واغسله بماء دافئ يحتوي على معقم مناسب

- رج العبوة جيداً قبل الاستخدام

الجرعات :

الحقن العضلي :

الجمال والخيول والأبقار : 25 مل لكل حيوان مرتين يومياً لمدة 4 أيام
الأغنام والماعز : 7 مل لكل حيوان مرتين يومياً لمدة 4 أيام

الحقن داخل الضرع :

الجمال والخيول والأبقار : 10 مل في كل ربع أو نصف ولمدة 3 أيام
الأغنام والماعز : 3-5 مل في كل نصف ولمدة 3 أيام

فترة السحب :

اللحم : 30 يوماً الحليب : 10 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 50 مل .