

لينكوجكت محلول معد للحقن

التركيب :

كل 1 مل يحتوي :

سبيكتينومايسين سلفات 100 مغ

لينكومايسين هيدروكلورايد 50 مغ

الخصائص الدوائية :

إن الجمع بين لينكومايسين وسبيكتينومايسين يعطي تأثيراً تراكمياً وأحياناً تآزرياً .
سبيكتينومايسين هو موقف لنمو الجراثيم أو قاتل لها وذلك حسب تركيز الجرعة ويكون تأثيره بشكل أساسي ضد الجراثيم سلبية الغرام مثل كامبيلوباكتر - إيكولاي - المايكوبلازما والسالمونيلا

لينكومايسين هو موقف لنمو الجراثيم ويؤثر بشكل أساسي ضد الجراثيم إيجابية الغرام كالمكورات العنقودية والمكورات السبحية

الاستطباب :

يوصف لعلاج حالات العدوى التنفسية والعدوى المعدية المعوية التي تسببها الأحياء الدقيقة الحساسة للسبيكتينومايسين واللينكومايسين مثل : الكامبيلوباكتر - إيكولاي - مايكوبلازما - سالمونيلا - المكورات العنقودية - المكورات السبحية في كل من العجول والأغنام والماعز والقطط والكلاب والدجاج والرومي

مضادات الاستطبابات :

- الحساسية المفرطة للسبيكتينومايسين و/أو اللينكومايسين
- الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كبدي
- لا يعطى للدجاج الذي يستخدم إنتاجه من البيض للاستهلاك البشري

الآثار الجانبية :

قد يحدث رد فعل تحسسي

التداخل الدوائي:

لا يعطى مع البنسيلينات - السيفالوسبورينات - الكينولونات .

طريقة الاستعمال :

الدجاج والرومي : حقن تحت الجلد .

بقية الحيوانات : حقن عضلي

الجرعات :

الحيوانات الكبيرة : 1 مل لكل 10 كغ من وزن الحيوان لمدة 3-5 أيام

الأغنام والماعز : 1 مل لكل 5 كغ من وزن الحيوان لمدة 3-5 أيام

فترة السحب :

الدجاج والرومي : اللحم : 7 أيام

بقية الحيوانات : اللحم : 14 يوماً الحليب : 3 أيام

الحفظ :

يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة :

عبوة زجاجية سعة 100 مل .