

مونوزيل معلق معد للشرب

التركيب: كل 1 مل يحتوي:

ألبندازول 50 مغ

نيكلوزاميد 35 مغ

الخصائص الدوائية:

ألبندازول مضاد ديدان واسع الطيف يملك الفعالية ضد الديدان الأسطوانية المعدية المعوية والديدان الرئوية والديدان الشريطية كما أنه فعال ضد الديدان الكبدية .
يؤثر ألبندازول على استقلاب الجلايكوجين ويخفض مستوى السكريات في الطفيلي ويوقف عملية الأكسدة مؤدياً إلى موت الطفيلي .
يؤثر النيكلوزاميد على جدار الخلية في الطفيلي وذلك بإقفال حلقة كريب في الديدان الشريطية ، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم حمض اللبن وبالتالي موت الطفيلي .

الاستطباب:

الديدان الخيطية المعدية المعوية: الأطوار اليرقية والبالغة من: هايمونكوس – أوسترتاجيا – ترايكوسسترونجيلوس – نيماتوديروس – كوبيريا بونوستوموم – الأطوار البالغة: من أوبسوفوجوستوموم – شابرتيا – سترونجيلويدس

الديدان الرئوية: ديكتيوكاولوس

الديدان الشريطية: مونيزيا

الديدان الأسطوانية: أسكاريس

الديدان الكبدية: الأطوار البالغة (فاشيولا)

وذلك عند الأبقار والأغنام والماعز

التحذيرات:

لا يعطى في المراحل المبكرة من الحمل

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم مع ماء الشرب

ترج العبوة جيداً قبل الاستعمال

الجرعات:

جرعة واحدة صباحاً قبل تقديم العلف

الأبقار: 15 مل لكل 25 كغ من وزن الجسم

الأغنام والماعز: 5 مل لكل 25 كغ من وزن الجسم

تضاعف الجرعة في حالات الإصابة بالديدان الكبدية البالغة

فترة السحب:

الحم: 14 يوماً الحليب: 5 أيام

الحفظ: يحفظ في أوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس .

التعبئة: عبوة بلاستيكية سعة 1 لتر و 500 مل .